


検体採取チェック表

＝ はじめにお読みください ＝

- ◆検査キットはご注文日より**6ヶ月以内**に使用してください。
- ◆検体採取後は**（複数検体は一度にまとめて）**すみやかに返送をお願いします。
- ◆検査完了後は採り直しキット送付はできません。検査前は採り直しキットをお送りできますが、ローコストパッケージをご注文の場合は有料となります。
- ◆血液が検体の検査では、使用・未使用に関わらず全てのランセット(血液採取器具)と消毒綿は、お届けしております「医療廃棄物返送用袋」にてご返送ください。
- ◆「検査申込書お客様控」以外の**不要な書類**は、検体と一緒に返信用封筒に入れて返送いただければ、こちらで処分いたします。



郵送検査キットで「より良い検査をより早く」

GMME医学検査研究所

株式会社GMME 高崎市登録第54号 登録衛生検査所

☎0120-219-912

携帯電話・PHSからは 027-310-7000

受付時間： 10:00～19:00（365日対応）

順番	検査項目	検査を受ける時期	採取検体	検体採取のタイミング	チェック	返送の注意
	HIV抗体	感染が疑われる行為から、 3ヶ月経過後	血液	特になし		
	梅毒	感染が疑われる行為から、 1-2ヶ月経過後	血液	特になし		よく乾いた事を確認したら、速やかに。 アルコール綿は検体と同封しない。
	B型肝炎	感染が疑われる行為から、 2-3ヶ月経過後	血液	特になし		
	C型肝炎	感染が疑われる行為から、 3ヶ月経過後	血液	特になし		
	性器淋菌	感染が疑われる行為から、 1-2日後 <small>(治療確認の検査の場合) 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	尿	起床後の初尿(出始めの尿) 【上記で採取できなかった場合】最後の排尿後から2～3時間経過後の初尿でも可		なるべく当日中
	性器クラミジア	感染が疑われる行為から、 1-2日後 <small>(治療確認の検査の場合) 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	尿	起床後の初尿(出始めの尿) 【上記で採取できなかった場合】最後の排尿後から2～3時間経過後の初尿でも可		なるべく当日中
	トリコモナスDNA	感染が疑われる行為から、 1-2日後 <small>(治療確認の検査の場合) 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	尿	起床後の初尿(出始めの尿) 【上記で採取できなかった場合】最後の排尿後から2～3時間経過後の初尿でも可		なるべく当日中
	カンジダ	随時検査可能	陰茎表皮擦過物	入浴前		なるべく当日中
	のど(咽頭)淋菌	感染が疑われる行為から、 1-2日後 <small>(治療確認の検査の場合) 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	うがい液	起床後、飲食やうがい・歯磨きの前に採取 【上記で採取できなかった場合】最後の飲食後やうがいから1～2時間経過後でも可		なるべく当日中
	のど(咽頭)クラミジア	感染が疑われる行為から、 1-2日後 <small>(治療確認の検査の場合) 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	うがい液	起床後、飲食やうがい・歯磨きの前に採取 【上記で採取できなかった場合】最後の飲食後やうがいから1～2時間経過後でも可		なるべく当日中
	大腸がん	随時検査可能	便(2日分)	連続した2日間 【連続で採取できなかった場合】1回目から4日以内に2回目の便を採取(その間は冷蔵保管)		冷暗所に保管し クール宅配便で速やかに
	胃がん予防	随時検査可能	便	特になし		冷暗所に保管し クール宅配便で速やかに
	肺がん	随時検査可能	喀痰(3日分)	起床後の連続した3日間 【上記で採取できなかった場合】出やすい時間帯での採取でも可		なるべく当日中

順番	検査項目	検査を受ける時期	採取検体	検体採取のタイミング	チェック	返送の注意
	HIV抗体	感染が疑われる行為から、 3ヶ月経過後	血液	特になし		
	梅毒	感染が疑われる行為から、 1-2ヶ月経過後	血液	特になし		よく乾いた事を確認したら、速やかに。 アルコール綿は検体と同封しない。
	B型肝炎	感染が疑われる行為から、 2-3ヶ月経過後	血液	特になし		
	C型肝炎	感染が疑われる行為から、 3ヶ月経過後	血液	特になし		
	性器淋菌	感染が疑われる行為から、 1-2日後 <small>(治療確認の検査の場合) 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時		なるべく当日中
	性器クラミジア	感染が疑われる行為から、 1-2日後 <small>(治療確認の検査の場合) 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時		なるべく当日中
	トリコモナスDNA	感染が疑われる行為から、 1-2日後 <small>(治療確認の検査の場合) 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時		なるべく当日中
	カンジダ	随時検査可能	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時		なるべく当日中
	のど(咽頭)淋菌	感染が疑われる行為から、 1-2日後 <small>(治療確認の検査の場合) 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	うがい液	起床後、飲食やうがい・歯磨きの前に採取 【上記で採取できなかった場合】最後の飲食後やうがいから1～2時間経過後でも可		なるべく当日中
	のど(咽頭)クラミジア	感染が疑われる行為から、 1-2日後 <small>(治療確認の検査の場合) 投薬完了後、1-2週間程度開けてから検査を受ける</small>	うがい液	起床後、飲食やうがい・歯磨きの前に採取 【上記で採取できなかった場合】最後の飲食後やうがいから1～2時間経過後でも可		なるべく当日中
	HPV	随時検査可能	膣分泌物	生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、薬を塗ってない時		なるべく当日中
	子宮頸がん	随時検査可能	子宮頸部擦過物	妊娠中・生理中でなく、直前に性交や洗浄してなく、入浴前		なるべく当日中
	大腸がん	随時検査可能	便(2日分)	生理中でない連続した2日間 【連続で採取できなかった場合】1回目から4日以内に2回目の便を採取(その間は冷蔵保管)		冷暗所に保管し クール宅配便で速やかに
	胃がん予防	随時検査可能	便	特になし		冷暗所に保管し クール宅配便で速やかに
	肺がん	随時検査可能	喀痰(3日分)	起床後の連続した3日間 【上記で採取できなかった場合】出やすい時間帯での採取でも可		なるべく当日中